

阿蘇山の火山活動解説資料（令和 7 年 5 月）

福岡管区气象台

地域火山監視・警報センター

火山活動は低下した状態で推移しています。

火山性微動の振幅は概ね小さな状態で経過しました。火山ガス（二酸化硫黄）の 1 日あたりの放出量は少ない状態でした。

GNSS 連続観測では、深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において、2024 年 10 月頃から縮みの傾向がみられています。

火口内では、土砂や火山灰が噴出する可能性があります。また、火口付近では火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2、図 4-①⑥⑧）

中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上 1,000m（4 月：500m）まで上がりました。

5 月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約 8 割と前月（4 月：約 8 割）と同程度でした。湯だまり内に噴湯を確認しましたが、土砂噴出はみられませんでした。赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの最高温度は 64～66℃と前月（4 月：60～62℃）と同程度でした。南側火口壁の最高温度は 135～193℃と前月（4 月：238～287℃）と比べて低下しました。

・地震や微動の発生状況（図 3、図 4-②～④、図 5）

火山性微動の振幅は、23 日 11 時頃に一時的に大きくなりましたが、概ね小さな状態で経過しました。火山性地震の月回数は 3,283 回（4 月：3,062 回）と、多い状態でした。孤立型微動は 2,070 回（4 月：1,684 回）と、前月より増加しました。1 月中旬頃から火山性地震と孤立型微動が増加した状態が続いています。

求まった火山性地震の震源は、中岳火口付近のごく浅いところから深さ 1 km 付近に分布しました。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

今回の火山活動解説資料（令和 7 年 6 月分）は令和 7 年 7 月 8 日に発表する予定です。

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、九州大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び阿蘇火山博物館のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』及び『電子地形図（タイル）』を使用しています。

・火山ガスの状況（図 4-⑤）

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1 日あたり 500～600 トン（4 月：300～700 トン）と少ない状態でした。

・地殻変動の状況（図 6、図 7）

GNSS 連続観測では、深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において、2024 年 10 月頃から縮みの傾向がみられています。



図 1 阿蘇山 中岳第一火口の噴煙の状況（5 月 28 日、草千里監視カメラ）

白色の噴煙が最高で火口縁上 1,000m（4 月：500m）まで上がりました。




図 2-1 阿蘇山 現地調査観測位置図（観測位置及び撮影方向）



図 2-2 阿蘇山 中岳第一火口底の状況
(火口南西側観測定点から撮影 上図：5月23日、下図：4月24日)

- ・ 5月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約8割と前月（4月：約8割）と同程度でした。
- ・ 湯だまり内に噴湯を確認しましたが、土砂噴出はみられませんでした。
- ・ 赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの最高温度は64～66℃と前月（4月：60～62℃）と同程度でした。

※赤外熱映像装置で撮影した画像は、5月23日は13時09分～14分、4月24日は09時46分～52分の複数の画像を合成し噴煙の影響を軽減しました。




図 2-3 阿蘇山 中岳第一火口 南側火口壁の状況
（火口南西側観測定点から撮影 上図：5月23日、下図：4月24日）

5月に実施した現地調査では、赤外熱映像装置による観測で、南側火口壁の最高温度は135～193℃と前月（4月：238～287℃）と比べて低下しました。

※赤外熱映像装置で撮影した画像は、5月23日は13時32分～37分、4月24日は10時10分～15分の複数の画像を合成し噴煙の影響を軽減しました。




図 3 阿蘇山 火山性微動の1分間平均振幅の時間変化
（中岳西山腹観測点南北動成分、5月23日10時00分～13時00分）

5月23日11時頃に、火山性微動の振幅に一時的な増大がみられました。




図4 （前ページ）阿蘇山 火山活動経過図（2023年6月～2025年5月）

< 5月の状況 >

- ・中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上1,000m（4月：500m）まで上がりました。
- ・火山性地震の月回数は3,283回（4月：3,062回）と、多い状態でした。孤立型微動は2,070回（4月：1,684回）と、前月より増加しました。1月中旬頃から火山性地震と孤立型微動が増加した状態が続いています。
- ・火山性微動の振幅は、23日11時頃に一時的に大きくなりましたが、概ね小さな状態で経過しました。
- ・火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1日あたり500～600トン（4月：300～700トン）と少ない状態でした。
- ・5月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約8割と前月（4月：約8割）と同程度でした。
- ・南側火口壁の最高温度は135～193℃と前月（4月：238～287℃）と比べて低下しました。

②と③の赤線は回数の積算を示しています。⑤、⑥および⑧は現地調査の結果を示しています。

⑥の湯だまり量及び湯だまり面標高は、火口縁からの観測で確認しています。

⑦はアメダス阿蘇乙姫（中岳第一火口より北西約8km）の観測値です。

⑧は赤外熱映像装置で計測しています。火口底温度は湯だまり表面と南側火口壁を除く火口内の温度を示しています。




図5 阿蘇山 火山性地震の震源分布

< 5月の状況 >

求まった火山性地震の震源は、中岳火口付近のごく浅いところから深さ1km付近に分布しました。




図 6 阿蘇山 GNSS 連続観測による基線長変化（2010 年 10 月～2025 年 5 月）

GNSS 連続観測では、深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において、2024 年 10 月頃から縮みの傾向がみられています。

これらの基線は図 7 の①～⑦に対応しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

2016 年 4 月 16 日以降の基線長は、平成 28 年（2016 年）熊本地震の影響による変動が大きかったため、この地震に伴うステップを補正しています。

2016 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

（国）：国土地理院




図7 阿蘇山 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 （国）：国土地理院




図8 阿蘇山 観測点配置図

小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
(京) : 京都大学、(防) : 防災科学技術研究所、(博) : 阿蘇火山博物館、(国) : 国土地理院